

Edad	CALENDARIO VACUNAL 2018 REGIÓN DE MURCIA (para nacidos a partir del 1 de julio de 2016)											RECOMENDADAS AEP		
	Difteria	Tetanos	Tos fer.	Hib	VHB	Polio	Neumo ⁽¹⁾	Men C	TV	Varicela	VPH	Rotav ⁽⁷⁾	Men B ⁽⁸⁾	Varic
2 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		
2-3 meses													<input checked="" type="checkbox"/>	
4 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
4-5 meses													<input checked="" type="checkbox"/>	
6 meses												<input checked="" type="checkbox"/>		
6-7 meses													<input checked="" type="checkbox"/>	
11 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
12 meses								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
13 meses													<input checked="" type="checkbox"/>	
15 meses											<input checked="" type="checkbox"/> ⁽²⁾			
2 años														<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁹⁾
4 años									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽²⁾				
6 años	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽³⁾	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽³⁾	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽³⁾				<input checked="" type="checkbox"/> ⁽³⁾							
11-12 años								<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁴⁾		<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁵⁾	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁶⁾			
14 años	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												

- (1) En los lactantes de alto riesgo la pauta será de 4 dosis (2, 4, 6 y 15 meses). En los casos de situaciones de alto riesgo en otras edades, definidas por los correspondientes protocolos del Servicio de Prevención y Protección de la Salud, se podrá administrar una pauta secuencial conjugada-polisacárida simple o una exclusiva de esta última.
- (2) Para nacidos a partir del 1 de enero de 2015.
- (3) En forma de DTPa/VPI. Para los nacidos antes del 1 de julio de 2016, solo dTpa.
- (4) Para nacidos en 2007.
- (5) Para aquellos niños no vacunados anteriormente (o con solo una dosis) o con historia previa de padecimiento incierta o negativa en régimen de dos dosis separadas al menos por un mes.
- (6) Para las niñas nacidas en 2007. Esquema de vacunación de 0 y 6. En niñas no vacunadas: 0, 1-2 y 6 meses para las de 15 o más años y de 0 y 6 meses para las de 14 o menos años.
- (7) Rotarix: 1ª dosis antes de las 12 semanas de vida. 2ª dosis antes de la 24 semanas de vida. RotaTeq: 1ª dosis antes de las 12 semanas de vida. 2ª dosis antes de la semana 32. Intervalo mínimo 4 semanas entre dosis.
- (8) Recomendamos separarla al menos 15 días respecto a las vacunas de calendario.
- (9) Para pacientes susceptibles mayores de 2 años y menores de 11 años, **a cualquier edad**: 2 dosis con intervalo de al menos 1 mes, de preferencia 3 meses.